

*mis, solida, pallide violaceo-alba; spira turbinata, sat elongata, apice obtusulo; sutura parum conspicua, linearis; anfr. 6 quadrivaricosi (varicibus elevatis, crasse rotundatis, lœvigatis, longitudinaliter subobliquis, albis), primi 2 indistincti, sequentes costa unica, ultimus costis 2 validis, obtuse rotundatis, vix striatis albidis, cum varicibus commixtis transversim munitus, spiram vix superans, basi et ipsa unicostata attenuatus; apertura anguste ovata, intus violacea, in canalem brevissimum, fere nullum, violaceum desinens; peristoma subcontinuum, violaceum, margine columellari vix arcuato, externo intus obsoletissime denticulato, extus, occursu varicis ultimi, in alam crassam, breviter prominulam, albam producto. — Long. 17, diam. maj. 12 mill. Apertura 7 mill. longa, 3 1/2 lata. (Coll. E. Liénard.)*

*Habitat ad littus insulæ Mauritii, haud frequens.*

E. L.

---

Diagnosis **Bulimuli** novi, **Guatemala** incolæ,

AUCT. H. CROSSE ET P. FISCHER.

**BULIMUS ISTAPENSIS**, Crosse et Fischer.

*Testa vix obtecte subrimata, ovato-elongata, tenuis, minute et suboblique striatula, nitida, sordide albido-hyalina; spira subelongato-conica, apice obtusulo; sutura impressa; anfractus 6 vix convexiusculi, ultimus spira paulo minor (:: 6 1/2 : 8), basi subattenuatus, rotundatus; apertura acuminato-ovalis, intus concolor; peristoma simplex, rectum, margine columellari dilatato, rimam umbilici fornicatim et fere omnino obtegente; albido, basali et*

*externo acutis. — Long. 14 1/2, diam. maj. vix 7 mill.*

*Apert. 6 1/2 mill. longa, 4 lata. (Coll. A. Morelet.)*

*Hab. Istapa, Guatimalæ, in silvis. (A. Morelet.)*

H. C. et P. F.

---

Note complémentaire sur deux espèces provenant  
de la **Nouvelle-Calédonie**,

PAR LE DOCTEUR SOUVERBIE.

1. CHITON MONTROUZIERI, Souverbie.

Chiton insculptus, Souverbie, Journ. Conch., vol. XIV,  
p. 248, pl. IX, f. 5 (Junior!), 1866, nec  
A. Adams, Proceedings Zool. Soc., 1852.

Ajouter à la diagnose : examinée à la loupe, la surface de toutes les valves paraît très-finement chagrinée.

Long. 55 mill. et plus.

*Hab.* Ile Art; île Nou; Nouméa; assez commun.

2. CALEDONIELLA MONTROUZIERI, Souverbie.

Journ. Conchyl., vol. XVII, p. 421, et vol. XVIII, p. 71,  
pl. IX, f. 4.

« *Obs.* Le Caledoniella s'est trouvé plusieurs fois entre  
« les pattes des Gonodactyles ; seulement tous les échan-  
« tillons que j'ai recueillis, sauf celui que je vous ai en-  
« voyé et qui a servi à la diagnose, sont très-petits ; on ne  
« l'a pas trouvé ailleurs.

« Il me semble qu'on pourrait le placer à côté des Ca-  
« bochons. »

(Montrouzier in litt. Presqu'île Ducos, 14 fév. 1873.)

S.

---